

Ueber

wahre Hypertrophie der Leber bei idiopathischer Herzhypertrophie

bei Leuten vom 20. bis 60. Lebensjahre.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

in der gesamten Medizin

verfasst und einer

Hohen medizinischen Fakultät

der

Kgl. Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Adolf Kimmerle

Medizinalpraktikant aus Lindau i. B.

München 1908.

Buchdruckerei J. Fuller, Weinstrasse 3.

Ueber

wahre Hypertrophie der Leber bei idiopathischer Herzhypertrophie

bei Leuten vom 20. bis 60. Lebensjahre.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

in der gesamten Medizin

verfasst und einer

Hohen medizinischen Fakultät

der

Kgl. Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Adolf Kimmerle

Medizinalpraktikant aus Lindau i. B.

München 1908.

Buchdruckerei J. Fuller, Weinstrasse 3.





Digitized by the Internet Archive
in 2026

Meinen Eltern!

Referent:

Herr Obermedizinalrat Prof. Dr. v. Bollinger.

Nicht ganz selten findet man bei der sogenannten idiopathischen Herzhypertrophie eine Leber, deren Gewicht bedeutend die Norm überschreitet, welch' letztere ja allerdings erheblichen individuellen Schwankungen unterworfen ist. Worauf diese **Hypertrophie der Leber** bei der erwähnten Herzkrankheit beruht, ist noch nicht sicher aufgeklärt. Grosse Lebern kommen ja auch bei anderen Zuständen, z. B. bei Diabetikern vor. Eine andere Art der Hypertrophie und zwar die regenerative Form tritt, wie Ponfick zeigte, nach Verlust von Leberparenchym in grosser Ausdehnung auf. Dieser Autor fand, dass nach operativer Entfernung von $\frac{4}{5}$ der Leber nach einigen Wochen fast das ursprüngliche Volumen der Leber wieder erreicht war, indem der zurückgebliebene Rest des Lebergewebes eine entsprechende Vergrösserung durch Hyperplasie seiner acini und Vermehrung ihrer Zellen erfahren hat. Solche **regenerative Hypertrophieen** spielen nach Schmaus eine wichtige Rolle auch bei anderen Erkrankungen, in deren Verlauf Lebergewebe zu Grunde geht; man trifft einzelne vergrösserte Läppchen und ganze Gruppen von solchen, welche offenbar eine kompensatorische Hypertrophie aufweisen, bei akuter gelber Leberatrophie, der Lebercirrhose, beim Echinokokkus der Leber u. s. w.; auch in dem der eigentlichen Cirrhose oft vorausgehenden Stadium der Leberhypertrophie der Säufer sind derartige vergrösserte Läppchen und Einschaltungen jungen Lebergewebes häufig. Kaufmann schreibt in seinem Lehrbuch der pathologischen Anatomie auf S. 546 speziell über die **partielle Hypertrophie** folgendes:

»Die partielle (kompensatorische) Hypertrophie der Leber ist nicht selten. Man sieht sie im Groben, wenn ein Echinokokkussack z. B. den rechten Lappen einnimmt und dessen Parenchym zur Atrophie bringt; der linke Lappen kann dann

ausserordentlich gross werden. Diese kompensatorische Hypertrophie bildet sich selbst noch im hohen Alter aus. Infolge eines entzündlichen Prozesses, den man meist abgelaufen findet, kann ein ganzer Lappen zu einem kleinen, fibrösen Gebilde zusammenschrumpfen; die anderen Lappen findet man dann vergrössert. Auch bei der Schnürleber, der gelappten Leber der Syphilitischen, bei Anwesenheit zahlreicher Geschwulstknoten oder Cysten kann man eine grobe Hypertrophie beobachten. Die einzelnen Acini können grösser erscheinen als normal. Sehr häufig vollzieht sich eine solche Regeneration bei noch bestehender krankhafter Veränderung, so bei den verschiedenen Formen chronischer, interstitieller hepatitis; es treten Wucherungen von Leberzellen und Gallengangsepithelien auf. Nach Ablauf eines mit Untergang von Leberzellen vorhergehenden Entzündungsprozesses z. B. nach Infektion und Intoxikation, findet stets ein ausgiebiger regenerativer Ersatz von Leberzellen statt.“

Eine **Hypertrophie des Leberparenchyms** nimmt auch v. Bollinger in seinem »Atlas und Grundriss der pathologischen Anatomie« als Grund der grossen Leber an, wenn er schreibt:

»Diffuse, wahre Hypertrophie der Leber kommt öfters vor, namentlich in Verbindung mit leichter Zunahme des Stützgewebes, ein Zustand, der vielfach irrtümlich zur hypertrophischen Cirrhose (Pseudocirrhose) gerechnet wird; als ursächliche Momente sind chronische Stauung, plethora und Alkoholmissbrauch (Bier) zu nennen« und weiter unten, wo es beim Kapitel »Hypertrophische Cirrhose« heisst:

»In manchen Fällen ist bei der hypertrophischen Induration der Leber die bindegewebige Wucherung so geringfügig, dass aus ihr kaum die bedeutende Massenzunahme des Organes erklärt werden kann; in solchen Fällen, die auch keine weiteren Komplikationen (Stauung im Pfortadergebiet) mit sich bringen, liegt offenbar eine **wahre Hypertrophie** des Parenchyms mit leichter interstitieller Wucherung vor«.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen sei es mir nun gestattet, dass ich an der Hand von 113 Fällen einen statistischen Ueberblick über **das Verhalten der Leber bei**

Herzhypertrophie bringe. Die Zusammenstellung umfasst die in den Jahren 1891—1905 im pathologischen Institut zu München zur Sektion gekommenen Fälle vom 20.—60. Lebensjahre. Selbstverständlich sind diejenigen Herzhypertrophien, wie sie sich nach Schrumpfnieren, Lungenemphysem, Arteriosclerose etc. einzustellen pflegen, nicht mit in die Statistik eingegriffen. Als Maximum der physiologischen Schwere der männlichen Leber nehme ich 1600 gr an, der weiblichen 1500 gr. Die Auszüge aus den betreffenden Sektionsprotokollen sollen im Groben erfolgen, wobei vorwiegend Gewicht und Grössenverhältnisse der Leber und des Herzens Berücksichtigung finden sollen. Von den 117 Fällen sind 18 Frauen, die ich gleich an der Spitze anführen werde und 99 Männer, die ich als 2. Gruppe aufzählen möchte.

Tabelle I: **Frauen.**

Lfd. Nummer	Nummer des Sektionsprot.	Anatomische Diagnose	Alter	Herz			Leber		
				Gewicht	Dicke des l. Ventrik.	Dicke des r. Ventrik.		Gewicht	
1901.									
1.	10	Erweichungsherd der linken Hemisphäre des Grosshirns, Hypertrophie und Dilatation des linken Ventrikels, Stauungsleber u. -Nieren.	59	380	1.5	0.3	Linker Ventr. gänse-eigross, mit brüchiger Muskulatur. Linker Vorh. hühner-eigross.	1190	Kapsel glatt, Konsistenz derb, acinöse Zeichnung deutlich, Stauung.
2.	232	Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Hypostase im linken Unterlappen, Emphysem.	51	350	1.5	0.5	Beide Ventrik. mässig dilatiert, mit kräftiger, blassbrauner Muskulat.	1640	Gross, Schnittfl. gelbbraun, mit etwas verwaschener, blasser Muskatuszeichnung. Fett- und Blutgehalt mässig, Schnittfläche glatt.
3.	758	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Stauungsleber.	56	340	2.3	0.6	Nach beiden Seiten stark vergrössert. Muskulatur beider Ventrikel kräftig, zäh und dunkelbraun.	2010	Gewebe fast knirschend, Zeichnung der acini muskatnussförmig.

4. 919	Idiopathische Hypertrophie des Herzens mit terminaler Dilatation, Stauungsleber.	56	630	1.6	0.6	Beide Ventrikel mit verdickter Muskulatur, die gelbliche Einlagerungen aufweist. Beide Vorh. ebenfalls mit verdickter Wandung.	2240	Konsistenz zäh, auf der Schnittfläche ist das Organ abwechselnd feingranuliert und grobkörnig granuliert; das Bindegewebe ist vermehrt; das Organ induriert.
1902.								
5. 279	Hypertrophie des linken Ventrikels bei adipositas cordis, Fettleber.	56	620	1.6	0.2	Linker Ventrikel mit starker, straffer Muskulatur.	2020	Gross, mit glatter Oberfläche; Organ brüchig, weich, Läppchenzeichnung nicht erkennbar.
6. 558	Grosser apoplektischer Herd im Grosshirn; idiopath. Hypertrophie des linken Ventrikels.	58	350	1.5	0.4	Beide Ventr. mit verdickter, blassbrauner, leicht brüch. Muskulatur. L. Vorhof mit kräftiger Wandung.	1170	Acinöse Zeichnung etwas verwaschen.
1903.								
7. 9	Hypertrophie und Dilatation des Herzens; Stauungsleber.	52	615	2.0	0.7	Um das doppelte vergr. Beide Ventr. mit derber, kräftiger Muskulatur	1930	Blassbräunlich, das Gewebe derb, auf d. Schnitt das Organ schwarzgelblich.
8. 42	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens; lunetische Lebernarben.	24	430	1.1	0.4	Beide Ventrikel mit blassbrauner, mässig verdickter Muskulatur.	1730	Auf dem Schnitte ist das Organ wenig blutreich, Centren der acini rot, Peripherie gelblich.

Lfde. Nummer	Nummer des Sektionsprot.	Anatomische Diagnose	Alter	Herz				Leber	
				Gewicht	Dicke des l. Ventrik.	Dicke des r. Ventrik.		Gewicht	
9.	117	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens; Stauungsorgane.	53	475	1.3	0.4	Beide Ventrikel je grösser mit dunkelbrauner, verdickter Muskulatur.	?	Sehr gross, Gewebe atrophisch, auf der Schnittfläche deutliche Muskaturzeichnung.
1904.									
10.	700	Apoplexie des linken Grosshirnes, Hypertrophie und Dilatation des Herzens.	45	460	1.8	0.3	R. Vt. hühnereigross, mit zarter, blassbrauner Wandung. L. V. hühnereigross, m. blassbrauner, weicher Muskulatur.	?	Von gehörigem Volumen, das braune, schlaffe Gewebe schneidet sich etwas derb. Die acinöse Zeichnung ist nicht sichtbar.
11.	925	Adipositas cordis, Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Stauungsorgane, Lungenemphysem.	58	570	1.4	0.4	Beide Ventrikel mit kräftiger, brüchiger, dunkelbrauner Muskulatur.	1700	Von normaler Grösse, das Gewebe schneidet sich derb, auf der Schnittfläche ist die acinöse Zeichnung deutlich.
12.	1004	Hypertrophie und Dilatation des Herzens; adipositas cordis.	42	395	1.2	0.4	Beide Ventrikel erweitert, mit blasser, kräftiger Muskulatur.	1360	Sehr animisch, Consistenz etwas vermindert. Acinöse Zeichnung noch deutlich.

13. 1067	Hypertrophie und Dilatation des Herzens; Stauungsfettleber.	37	400	1.3	0.4	Beide Ventrikel erweitert, mit derber, dunkler verdickter Muskulatur.	1500	Farbe gelbbraun, Stauungsfettleber.
14. 1116	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens, fettige Degeneration der Herzmuskulatur, Muskelnussleber.	50	425	1.1	0.7	Rechter Vorhof und Ventr. je gänseeigross, mit hypertrophischer, brüchiger Muskulatur. L. V. mit starker brüchiger Muskulatur.	1300	Klein; das Gewebemorsch, die Muskelnusszeichnung ist deutlich, der Blugehalt gering.
1905.								
15. 235	Hypertrophie u. Dilatation des Herzens, schwierige Degeneration des Herzmuskels.	?	?	?	?	Beide Vorh. ziemlich weit. Beide Vt. weit mit dicker, brüchiger Muskulatur.	?	Klein, das Organ schneidet sich derber als normal, acinöse Zeichnung deutlich.
16. 508	Concentrische Hypertrophie und Dilatation des Herzens; indurierte Stauungsleber	51	550	1.7	0.6	L. Vtr. mit stark entwickelter Muskulatur. R. Vtr. mit blassem, schlaffem, aber starkem Myocard.	1900	Mit zahlreichen höckerigen Unebenheiten. Auf dem Schnitt ist das Organ v. unregelmässiger Zeichnung. Consistenz derb.
17. 514	Hypertrophie und Dilatation des Herzens, chronische Stauung u. Induration der Leber.	49	545	1.3	0.8	Beide Ventrikel je über gänseeigross, mit stark hypertrophischer Wandung.	1600	Schnittfläche mit unregelmässiger Zeichnung, Consistenz vermehrt, acinöse Zeichnung wenig deutlich.

Tabelle II: **Männer.**

Lfd. Nummer	Nummer des Sektionsprot.	Anatomische Diagnose	Alter	H e r z				L e b e r	
				Gewicht	Dicke des l. Ventrik.	Dicke des r. Ventrik.		Gewicht	
18.	1040	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens. Induration und Atrophie der Leber. Allgemeiner mässiger Hydrops.	60	460	1.7	0.5	Beide Ventrikel erweitert, mit kräftig entwickelter Wandung	900	Die Farbe ist schmutzig dunkelbraun, das Parenchym blutarm, Muskelnusszeichnung deutlich vorhanden.
1901.									
1.	70	Dilatation und Hypertrophie beider Ventrikel, myodegeneratio cordis; indurierte und vergrösserte Leber.	56	490	1.6	0.4	Beide Vent. je grösser mit sehr kräftiger, hellgelblicher fettig glänzender Muskulatur.	1700	Derb, blut- u. sehr saftreich. Auf der unebenen Schnittfläche ist die Muskelnusszeichnung nicht sehr deutlich.
2.	134	Hypertrophie und Dilatation beider Ventrikel. Chalikosis, hypertropische Cirrhose.	42	465	?	?	Beide Ventrikel je grösser mit verdickter Muskulatur.	2000	Beim Einscheiden knirscht das Gewebe. Das Bindegewebe ist vermehrt, der Blutgehalt gering.

3.	150	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation beider Ventrikel; hypertrophische Lebercirrhose.	24	450	1.5	0.3	Beide Ventrikel je gänseeigross mit kräftiger rötlicher Muskulatur.	1670	Das Gewebe knirscht beim Einschnelden. Das Bindegewebe ist vermehrt, der Blutgehalt gering.
4.	181	Ca recti; Tbc. der linken Lunge; Hypertrophie und Dilatation des Herzens.	52	490	1.2	0.6	Muskulatur beiderseits hypertrophisch, blassbraunrot.	?	Oberfläche glatt, Consistenz mässig, Schnittfläche braungelb, mit deutlicher Zeichnung.
5.	243	Hypertrophie und Dilatation des Herzens; Stauungsorgane.	44	?	?	?	Muskulatur beiderseits hypertrophisch, fettig glänzend.	?	Gross , dunkel, Consistenz vermehrt, Oberfläche glatt. Auf der Schnittfläche ist d. Muskelkonuszeichn. deutlich. Blut- und Fettgehalt ziemlich reichlich.
6.	267	Frische Blutung in den Pons; Hypertrophie des Herzens.	45	520	1.5	0.9 (+ Fett)	Beide Ventr. mit stark fettig degenerierter und von Fett durchwachsender Muskulatur.	2165	Consistenz mittelderb. Schnittfläche von braungelber Farbe, Zeichnung verwaschen.
7.	298	Hypertrophie beider Ventrikel; Stauungsleber.	50	700	2.0	0.8	Beide Ventrikel: Muskulatur enorm entwickelt, zäh.	1460	Auf der Schnittfläche zeigt das Organ deutlich erkennbare Bindegewebszüge.

I. fide. Nummer	Nummer des Sektionsprot.	Anatomische Diagnose	Herz				Leber	
			Alter	Gewicht	Dicke des I. Ventrik.	Dicke des r. Ventrik.	Gewicht	
8.	416	Hypertrophie und Dilatation beider Ventrikel, Muskelnussleber.	40	500	1.5	0.4	Beide Ventrikel je gänseeigross, mit braunroter, gut entwickelter Muskulatur.	1750 Kapsel glatt. Das Organ schneidet sich weich, Blutgehalt gering.
9.	501	Hypertrophie des Herzens, beiderseitiger Hydrothorax.	50	760	2.0	0.6	Beide Ventrikel stark erweitert mit hellbraunroter, ziemlich dicker Muskulatur.	1190 Erheblich verkleinert, das Gewebe schneidet sich ziemlich derb.
10.	472	Hypertrophie des Herzens nebst adipositas cordis; Muskelnussleber.	32	770	1.4	0.8	Beide Ventrikel und Vorhöfe mit verdickter blassbraunroter Muskulatur.	In allen Durchmessern vergrössert. Das Gewebe schneidet sich derb u. knirschend, das Parenchym ist blutreich, zäh, stecknadelkopf- bis erbsengrosse Körnchen aufweisend. Muskelnusszeichnung sehr ausgesprochen.
11.	629	Hypertrophie, Dilatation und fettige Degeneration des Herzens, herdförmige, schwierige Myokarditis, Induration der Leber.	50	450	1.0	0.5	Beide Vt. mit mässig erweiterten Höhlen, verdickter blassbrauner Muskulatur.	1750 Das Gewebe schneidet sich derb, ist blutreich, die Farbe blassbraunrot, die Zeichnung verwischt, Schnittfl. leicht höckerig.

12. 724	Hypertrophie des Herzens , Stauungsorgane, Emphysem der rechten Lunge.	49	465	?	?	Höhle beider Ventrikel erweitert, Muskulatur derb, braunrot, ziemlich dick.	1990	Gross und schwer, Konsistenz vermehrt. Die glatte, hellbraune Schnittfläche mit dunkler Muskatuszeichnung.
13. 736	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens , fettige Degeneration des Myokardes; fetthaltige Stauungsleber .	30	360	?	?	Beide Ventrikel mit erweiterten Höhlen und mässig verdickter, schlaffer Wandung.	2470	Stark vergrössert, Gewebe sehr derb, blutreich. Peripherie der acini im allg. leicht überstehend, fetthaltig, hellgelblich.
14. 739	Hypertrophie und Dilatation beider Herzvent. , adipositas cordis; Induration der Leber .	40	?	?	?	Gross und schlaff; beide Ventr. erheblich dilatiert mit verdickter und schlaffer Muskulatur.	?	Sehr gross und derb, die Schnittfläche ist granul., Läppchenzeichnung nicht erkennbar.
15. 901	Idiopathische Hypertrophie des linken Ventrikels ; mäss. Abhmatosed. Aorta; Apoplexie im Grosshirn.	46	560	2.2	0.2	Linker Ventr. mannese Faustgross m. stark hypertrophischer Muskulatur.	1900	Gross u. derb. Das Organ ist derb, blutreich, von dunkelbrauner Farbe, die acin. Zeichn. ist verwasc.
16. 934	Mässige Hypertrophie und Dilatation beider Vt. ; terminales Lungenödem; Stauungsorgane.	55	700	2.3	0.5	Beide Ventrikel je gänseeigross, mit blassbrauner, stark verdickter Muskulatur.	2550	Gross und schwer, von derber Konsistenz. Das Gewebe schneidet sich knirschend, Zeichnung der acini erkennbar. Teilw. Muskatuszeichn.

Idee. Nummer	Nummer des Sektionsprot.	Anatomische Diagnose	Alter	H e r z				L e b e r	
				(Gewicht	Dicke des l. Ventrik.	Dicke des r. Ventrik.		Gewicht	
17.	972	Multiple Kontusionen des Schädels; Hypertrophie und myodegeneratio cordis; Fettleber.	41	550	1.5	0.5	Beide Ventrikel je gänseeigross mit hypertrophischer, fettig glänzender Muskulatur.	1590	Gross mit abgestumpften Rändern. Die Schnittfl. ist glatt, sehr fettreich, gleichm. braungelblich, Zeichnung verwaschen, Konsistenz vermehrt.
18.	974	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens; Stauungsleber.	46	535	1.4	0.6	Beide Ventrikel je gänseeigross mit verdickter, blassbrauner Wandung, Konsistenz erheblich.	1470	Das Gewebe schneidet sich härter als normal. Acinöse Zeichnung verwaschen. Das Gewebe ist kautschukartig.
19.	1086	Hypertrophie und Dilatation des Herzens; Lungenödem; Induration der Leber.	24	425	1.4	0.7	R. Vt. gänseeigross, m. verdickter, blassbrauner Muskulatur. L. Vt. $\frac{2}{3}$ so gross wie d. r. Vt. m. verdickter Muskulatur.	1380	Braungelb, Blutgehalt gering, acinöse Zeichnung deutlich, Konsistenz vermehrt.
20.	1142	Hypertrophie des Herzens, Stauungsorgane.	59	570	1.5	0.5	Beide Ventrikel mit braunroter, hypertrophischer, derber Muskulatur.	1470	Derb, auf der Schnittfläche mit ausgeprägter Körnchenzeichnung.

21.	2	Chronische fibröse endocarditis der Aorta, Hypertrophie und Dilatation des Herzens.	23	505	1.5	0.3	Ventrikel stark erweitert 1750 Wandung verdickt.	Gross mit glatter Schnittfläche, auf letzterer die Lappchenzeichnung gut erkennbar.
22.	25	Hypertrophie und Dilatation des Herzens Muskelnussleber.	32	550	1.6	0.6	Beide Ventrikel mit erweiterten Höhlen, Muskulatur blassbraun, verdickt, fettig glänzend.	Verkleinert, Consistenz vermehrt. Beim Einscheiden hört man Knirschen.
23.	119	Idiopathische Hypertrophie des Herzens. Stauungsorgane (Alkoholikus).	43	510	1.8	0.6	Beide Ventrikel gänseigross mit braunroter, verdickter Muskulatur.	Klein cyanotisch. Auf der Schnittfläche ist die Zeichnung verwaschen, unregelmässig, fettreich.
24.	124	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens.	41	445	1.7	0.6	Beide Ventrikel je gänseigross mit dicker, derber Muskulatur.	Etwas vergrössert , Farbe des Gewebes blass graugelblich, Zeichnung verwaschen, Gewebe knirschend.
25.	181	Hypertrophie und Dilatation des Herzens; Arteriosklerose der Aorta thoracica.	55	690	2.5	0.3	L. Vt. Enueigross, Muskulatur verdickt.	Consistenz leicht vermehrt, auf der Schnittfläche Muskatnusszeichnung.

Lfde. Nummer	Sektionsprot.	Anatomische Diagnose	Herz				Leber	
			Alter	Gewicht	Dicke des l. Ventrik.	Dicke des r. Ventrik.	Gewicht	
26. 212		Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Lungenödem.	22	635	?	?	2600	Beim Einschnneiden knirscht das Gewebe. Das Bindegewebe ist anscheinend vermehrt.
27. 231		Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens. Stauungsleber.	?	625	1.6	0.6	2050	Die Consistenz ist bedeutend vermehrt, beim Einschnneiden knirscht das Gewebe. Die Schnittfläche ist leicht gekörnt.
28. 253		Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Stauungsleber.	33	500	1.4	0.4	1770	Das Organ ist derb, grobhöckerig, auf der Schnittfläche mit deutlicher Muskatnusszeichnung.
29. 365		Hypertrophie des Herzens, trübe Schwellung der Leber.	37	?	?	?	?	Klein, mit gelblichen, landkartenförmigen Gebilden, welche sich auf dem Schnitte 1,5 cm ins Gewebe erstrecken.

30. 373	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Stauungsleber.	36	470	?	0.5	Beide Ventrikel, je grösser mit verdicktem blassbraunem Myokard.	2520	Das Gewebe schneidet sich derb und knirscht. Zeichnung auf der unebenen Schnittfläche deutlich.
31. 415	Idiopathische Hypertrophie des Herzens.	40	?	?	?	Petitorium bis 17 l Bier pro die.	?	Stauungsleber.
32. 455	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Lungenödem, Stauungsorgane.	40	650	1.5	0.6	Beide Ventrikel mit erweiterten Höhlen und verdickter, schlaffer, blassbrauner Muskulatur.	1920	Consistenz derber als normal, Blutgehalt gering, Farbe bräunlichgrau, an einzelnen Stellen Muskelnusszeichnung.
33. 472	Hypertrophie und Dilatation beider Ventrikel Pigmentation u. Atrophie der Leber.	57	?	?	?		1300	
34. 506	Phthisis pulmonum Hypertrophie des Herzens.	50	490	1.5	0.4	Beide Ventrikel mit derber, kräftiger Muskulatur.	1480	Consistenz vermehrt, Farbe braungelb, Muskelnusszeichnung.

Lfd. Nummer	Nummer des Sektionsprot.	Anatomische Diagnose	Herz				Leber	
			Alter	Gewicht	Dicke des l. Ventrik.	Dicke des r. Ventrik.	Gewicht	
35.	551	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens hypertrophische Lebercirrhose.	45	530	1.3	0.5	1900	Das Organ schneidet sich derb, auf der Schnittfläche ist das Gewebe blassbraunrot die acinöse Zeichnung nicht deutlich.
36.	595	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Lungenödem.	32	640	1.7	0.6	1690	Das Gewebe schneidet sich derber als normal, knirscht beim Schneiden, Muskatuszeichnung.
37.	610	Idiopathische Hypertrophie des Herzens, hypertrophische Lebercirrhose, Lungenödem.	41	495	1.7	0.6	1760	An einzelnen Stellen ist das Organ höckerig, das beim Einschnneiden knirscht. Die Consistenz ist zäh.
38.	647	Idiopathische Hypertrophie des Herzens, fettige Degeneration des Herzens.	35	630	1.8	0.6	2580	Consistenz derb, auf der Schnittfläche Muskatuszeichnung deutlich vorhanden.

39.	663	Meduläres Sarkom der Lunge, Hypertrophie und Dilatation des Herzens Fettleber.	57	600	1.4	0.4	Beide Ventrikel erweitert, mit stark fettiger, gut entwickelter Muskulatur.	2450	Gross und schwer, Gewebe weich und brüchig.
40.	675	Hypertrophie und Dilatation des Herzens.	37	550	1.5	0.7	Beide Ventrikel je gänseeigross, mit verdickter derber Muskulatur.	1500	Auf der Schnittfläche ist die Muskatnusszeichnung scharf ausgeprägt.
41.	736	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens, atrophische Lebercirrhose.	55	700	1.5	0.3	R. Ventrikel kleinfaustgross; l. Ventrikel gänseeigross. Muskulatur verdickt.	1070	Schnittfläche höckerig, Organ sehr derb, Bindegewebe vermehrt.
42.	815	Idiopathische Hypertrophie des Herzens, Lungenödem.	39	500	1.3	0.5	Beide Ventrikel je gänseeigross mit deutlich verdickter Muskulatur.	?	Mittelgross und glatt. Auf dem Schnitte ist das Organ blutreich, fettreich, die Muskatnusszeichnung deutlich.
43.	849	Tuberculosis pulmonum, Hypertrophie des Herzens.	40	380	1.7	0.4	L. Vt. fast gänseeigross mit derber, blassbrauner roter hypertrophischer Muskulatur.	1880	Die Schnittfläche ist braunrot, glatt, mit reichlichem Fettgehalt. Der Blutgehalt ist reichlich.
44.	876	Hypertrophie und Dilatation des Herzens.	56	955	2.1	0.6	Beide Ventrikel je mannshaufgross mit verdickter blassbrauner Muskulatur.	1540	Die Leber schneidet sich derb und zeigt auf der Schnittfläche eine feingekörnte, rotgelbliche Zeichnung.

Lfde. Nummer	Nummer des Sektionsprot.	Anatomische Diagnose	Alter	Herz				Leber	
				Gewicht	Dicke des l. Ventrik.	Dicke des r. Ventrik.		Gewicht	
45.	919	Hypertrophie und Dilatation des Herzens.	56	550	1.5	0.9	Beide Ventrikel mit erweiterten Höhlen und verdicktem Myokard.	2270	Schnittfläche im ganzen braunrot, glatt, mit deutlicher Muskatnusszeichnung.
46.	920	Hypertrophie und Dilatation des Herzens. Sclerose der aorta thoracica, Muskatnussleber.	45	640	1.8	0.6	Beide Ventrikel erweitert, mit dicker, aber weicher Wandung.	2840	An einzelnen Stellen mit unebener, höckeriger Oberfläche; Consistenz vermehrt, Zeichnung muskatnussförmig.
47.	940	Hypertrophie und Dilatation des Herzens.	56	530	1.5	0.6	Beide Ventrikel je grösser mit braunroter mässig verdickt. Muskul.	1350	Consistenz derb, Oberfläche stark höckerig, Schnittfläche blassbraun.
48.	956	Hypertrophie und Dilatation des Herzens.	52	500	2.0	0.7	Beide Ventrikel über hühnereigross erweitert, mit derber, verdickter Wandung.	1600	Das derbe Gewebe knirscht beim Einscheiden. Die Schnittfläche ist leicht höckerig
49.	965	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Stauungsleber.	55	600	1.7	0.4	Beide Ventrikel mit stark hypertrophischer, blassbraunroter Muskulatur.	1440	Das Organ schneidet sich derb, ist auf der Schnittfläche granuliert, der Blutgehalt beträchtlich.

1903.									
50.	2	Hypertrophie und Dilatation des Herzens, adipositas cordis.	54	650	2.0	0.6	Beide Ventrikel je über gänseeggross, die Wandung stark verdickt.	1900	Die Schnittfläche ist leicht höckerig, das Organ ist derb.
51.	51	Idiopathische Hypertrophie des Herzens.	59	?	?	?	Stark vergrössert und schwer. Beide Vt. erweitert mit kräftiger blassbraunroter Muskulatur.	?	Gross und ziemlich fettreich, Muskatnusszeichnung, etwas derber als normal.
52.	78	Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Atheromatose des arcus aortae.	46	520	1.5	0.5	Beide Ventrikel weit, mit blassbraunroter, verdickter Muskulatur.	1700	Schnittfläche mässig induriert, mit mässig deutlicher Zeichnung.
53.	93	Hypertrophie und Dilatation beider Ventrikel (potator).	58	?	?	?	In beiden Abschnitten erheblich vergrössert und verdickt. Muskulatur dunkelbraunrot, kräftig.	?	Organ sehr gross, hart, leicht granuliert, Blutgehalt reichlich.
54.	121	Concentrische Hypertrophie des linken Herzentrikels, indurierte Leber.	55	?	?	?	Nach beiden Seiten verbreitert. Beide Vt. mit verdickter Wandung.	?	Etwas vergrössert, von sehr harter Consistenz. Auf der Schnittfläche ist das Gewebe leicht gekörnt. Läppchenzeichn. nicht erkennbar.

Lide. Nummer	Sektionsprot.	Anatomische Diagnose	H e r z				L e b e r	
			Alter	Gewicht	Dicke des l. Ventrik.	Dicke des r. Ventrik.	Gewicht	
55.	129	Hypertrophie des Herzens (potator).	29	750	2.5	1.0	2370	Consistenz mässig, Schnittfläche mit dunkler, regulärer Muskatnuss- zeichnung.
56.	139	Idiopathische Hyper- trophie des Herzens Lungenödem, Stauungs- leber.	42	770	1.7	0.7	1610	Die Oberfläche stellen- weise leicht granuliert, Consistenz vermehrt, die acinöse Zeichnung ist unregelmässig.
57.	186	Idiopathische Hyper- trophie und Dilatation des Herzens, Stauungs- leber	40	850	1.7	0.7	1940	Oberfläche an einzelnen Stellen grobhöckerig. Das Gewebe ist ziemlich konsistent.
58.	190	Idiopathische Hyper- trophie und Dilatation des Herzens; Sklerose der Aorta.	36	700	1.7	0.7	1360	Mit glatter Schnittfläche, Consistenz vermehrt, Farbe blassbraungelb.
59.	514	Idiopathische Hyper- trophie und Dilatation des Herzens, hyper- trophische, glatte Leber- cirrhose.	44	580	1.7	0.6	2250	Das Gewebe ist derb, knirscht deutlich beim Einschneiden, Farbe des Organes blassbraun.

60. 523	Hypertrophie des ganzen Herzens, leichtes Emphysem, hypertrophische Lebercirrhose.	38	560	1.8	0.7	Beide Ventrikel je gänse- eigross mit verdickter Muskulatur.	2150	Das Gewebe schneidet sich sehr derb, beim Einschnneiden knirscht das Gewebe.
61. 613	Idiopathische Hypertrophie des Herzens Stauungsleber.	54	530	2.0	1.2	Beide Ventrikel hühner- eigross mit sehr kräftiger Muskulatur.	1300	Kapsel schlaff, Finger- eindrücke bleiben be- stehen. Gewebe blass- braun, Bindegewebe um d. Gefässe stark vermehrt.
62. 731	Idiopathische Hyper- trophie und Dilatation beider Ventrikel.	24	650	1.6	0.3	R. Vt. hühnereigross. L. Vt. gänseeigross Muskulatur verdickt, braunrot.	2000	Auf der Schnittfläche ist das Gewebe blassbraun. Der Blutgehalt ist mässig.
63. 767	Idiopathische Hyper- trophie und Dilatation des Herzens.	59	700	1.7	0.7	R. Vt. kleinfaustgross. L. Vt. gänseeigross. Muskulatur sehr kräftig.	1450	Ziemlich derb und zäh. Die acinöse Zeichnung ist deutlich, die Con- sistenz stark vermehrt.
64. 791	Idiopathische Hyper- trophie und Dilatation des Herzens; fethaltige Lebercirrhose.	45	550	1.6	0.5	L. Vt. gänseeigross, die Muskulatur ist verdickt.	2500	Die Leber schneidet sich derb und knirscht beim Einschnneiden. Das Parenchym ist von orange- gelber Farbe, die Schnitt- fläche fein gekörnt.

Lfde. Nummer	Nummer des Sektionsprot.	Anatomische Diagnose	Alter	Herz				Leber	
				Gewicht	Dicke des l. Ventrik.	Dicke des r. Ventrik.		Gewicht	
65.	871	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens; Stauungsleber.	48	650	1.4	0.7	R. Vt. hühnereigross. L. Vt. gänseeigross. Muskulatur blassbraun und verdickt.	2180	Das derbe Gewebe knirscht b. Einschnneiden. Die Farbe ist blass braungelblich, die Schnittfläche höckerig. An einzelnen Stellen ist die Muskatnusszeichnung deutlich.
66.	895	Crupöse Entzündung der linken Lunge; Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Hypertrophie der Leber.	35	470	1.7	0.8	Beide Ventrikel mässig erweitert, mit derber, verdickter, braunroter Muskulatur.	2380	Das Parenchym schneidet sich ziemlich leicht, die acinöse Zeichnung ist verwaschen, undeutlich.
1904.									
67.	150	Idiopathische Hypertrophie des Herzens, multiple marantische Thrombose des linken Ventrikels.	40	850	1.8	0.5	Beide Vt. mit sehr erweiterten Höhlen und starrer verdickter Muskulatur.	?	Sehr vergrößert, derb, auf der Schnittfläche von sehr feiner, deutlicher Muskatnusszeichnung.
68.	196	Hypertrophie und Myodegeneration des Herzens.	39	?	?	?	Mässig vergrößert, Muskulatur stark entwicelt.	?	Gross und fettreich.

69. 251	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens , Starkes Lungenödem, beginnende Stauungsschrumpfen.	58	650	2.0	0.5	Beide Ventrikel leicht vergrössert, mit sehr kräftiger, elastischer, blassroter Muskulatur.	1400	Das Organ schneidet sich derber als normal und ist auf dem Schnitte von hellbrauner Farbe.
70. 544	Hypertrophie des Herzens , Blutung in die linke Grosshirnhemisphäre.	56	550	1.6	0.7	R. Vt. hühnereigross. L. Vt. über gänseigross mit verdickter, hellbraunrot. Muskulatur.	1910	Acinöse Zeichnung mässig deutlich.
71. 570	Septicopyaemie; Hypertrophie und Dilatation des Herzens .	31	410	1.7	0.3	Beide Ventrikel erweitert, mit kräftiger blassbrauner Wandung.	?	Gross und schwer; Consistenz vermehrt, acinöse Zeichnung deutlich, der Blutgehalt gering.
72. 593	Hypertrophie des Herzens , adipositas cordis; Lungenödem.	37	600	1.8	0.7	Beide Ventrikel je gänseigross mit kräftiger Muskulatur.	1850	Auf der Schnittfläche ist das Parenchym orangefarbig, höckerig, die Zeichnung undeutlich.
73. 632	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens .	?	700	?	?	Beide Vt. je hühnereigross, mit verdickter Muskulatur.	?	Sehr gross u. schwer , Oberfläche nur an einz. Stellen leicht granuliert. Auf der Schnittfl. acinöse Zeichnung deutlich.
74. 661	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens , Sklerose der Brustaorta.	55	570	1.7	0.7	Beide Ventrikel erweitert, mit blassbrauner, derber Muskulatur.	?	Volumen annähernd normal . Gewebe zäh, Schnittfläche mit glatter Zeichnung.

Lfd. Nummer	Sektionsprot.	Anatomische Diagnose	Alter	Herz				Leber	
				Gewicht	Dicke des l. Ventrik.	Dicke des r. Ventrik.		Gewicht	
75.	700	Apoplexie des linken Grosshirnes, Hypertrophie und Dilatation d. Herzens.	45	460	1.8	0.3	R. Vt. hühnereigross. L. Vt. grösser als der rechte, Wandung kräftig, blassbraun.	?	Von gehörigem Volumen. Das Parenchym schneidet sich derb, die Farbe des schlaffen Gewebes ist blassbraun, die acinöse Zeichnung nicht sichtbar.
76.	815	Dilatation und Hypertrophie des Herzens.	36	400	1.5	0.4	Muskulatur blassbraun, verdickt, schlaff	?	Gross, blut- und fettreich.
77.	853	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens; Stauungsschrumpfnieren.	41	460	2.3	0.5	Beide Ventrikel von bedeutendem Umfange, mit sehr dicker Wandung.	1880	Consistenz ausserordentlich derb, auf d. Schnittfläche an einzelnen Stellen Körnung. Zeichnung vereinzelt erkennbar.
78.	901	Atrophische Lebercirrhose; concentrische Hypertrophie des linken Ventrikels.	55	475	2.3	0.3	Beide Ventrikel eng, mit ziemlich verdickter, von Fett durchsetzter Muskulatur.	1250	Oberfläche sehr uneben, grob- und feinhöckerig. Das Organ schneidet sich knirschend. Acinöse Zeichn. nicht erkennbar.
79	929	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens.	52	860	?	?	Muskulatur verdickt , graubraun, brüchig.	?	Ziemlich gross und schwer , schneidet sich derb, Zeichnung deutlich.

80. 1022	Hypertrophie und Dilatation des Herzens.	23	480	1.2	0.5	Beide Ventrikel je gänse-eigross mit mässig verdickter Wandung.	1500	Derb, auf der Schnittfläche von rotgelber Farbe.
81. 1032	Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Stauungsleber.	37	500	?	?	Beide Ventrikel je über hühnereigross mit stark verdickter Muskulatur.	2400	Zeichnung sehr deutlich, Blutgehalt ziemlich reichlich.
82. 1046	Hypertrophie und Dilatation des Herzens.	40	500	1.7	0.6	R. Vt. frauenfaustgross. L. Vt. gänse-eigross. Muskulatur derb, verdickt, blassbraun.	1650	Das Gewebe schneidet sich weich, der Blutgehalt ist gering, die acinöse Zeichnung ist deutlich.
83. 1101	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens. Induration der Leber.	50	650	2.0	0.7	Beide Ventrikel sehr stark dilatiert, mit sehr kräftiger, blassbrauner, derber Muskulatur.	1450	Das Gewebe schneidet sich derber als normal, Blutgehalt gering, die Farbe verwaschen, blass braungelblich.
1905.								
84.	7 Apoplexie des rechten Seitenventrikels, koncentrische Hypertrophie des Herzens.	28	580	2.4	0.5	R. Vt. klein hühnereigross, mit kräftiger brauner Muskulatur. L. Vtr. Muskulatur stark hypertrophisch, derb, braunrot.	1780	Auf der Schnittfläche ist das Organ von braunroter Farbe, die Zeichnung deutlich, der Blutgehalt ist gering.

Lfd. Nummer	Nummer des Sektionsprot.	Anatomische Diagnose	Alter	Herz				Leber	
				Gewicht	Dicke des l. Ventrik.	Dicke des r. Ventrik.		Gewicht	
85.	124	Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Emphysem der oberen, mässiges Oedem der unteren Lungenabschnitte.	54	?	1.4	?	B. Vt. je vom Umfange einer Billardkugel, mit blasser, brüchiger Muskulatur.	?	Klein, beim Einschnneiden Knirschen, Consistenz brüchig, Zeichnung muskatnussartig.
86.	159	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens; Sklerose d. Aorta. Muskatnussleber.	41	810	1.8	0.6	R. Vt. gänseeigross. L. Vt. 1 1/2 faustgross. Muskulatur beiderseits verdickt, von vermehrter Consistenz.	2100	Oberfläche flach höckerig kapselstreifig verdickt. Beim Einschnneiden knirscht das zähe Organ, Zeichnung muskatnussartig. Interstitielles Bindegewebe mehrfach strangförmig.
87.	212	Schlaffe Pneumonie beider U.-L.; koncentrische Hypertrophie des Herzens; mässige bindegewebige Induration der Leber.	51	540	2.8	1.4	L. Ventrikel stark verdickt. Mitralklappen sehnig verdickt, Trabekel und Papillarmuskel stark entwickelt.	1960	Auf dem Durchschnitt ist die acinöse Zeichnung deutlich; das harte Organ knirscht beim Einschnneiden. Die Consistenz ist deutlich vermehrt.

88	808	Hypertrophie und Dilatation des Herzens	60	450	1.5	0.5	Beide Ventrikel um das doppelte vergrößert, mit brauner, brüchiger, ver- dickter Wandung.	Verkleinert, das linke ventrikel ist sehr hoch steig. Das Gewebe schneidet sich sehr, die Seitenfläche ist leicht brüchig.
89	809	Hypertrophie und Dilatation des Herzens, mit beginnender Leber- stauung, Stauungsleber.	60	450	1.5	0.5	Beide Ventrikel umgegrössert und verdickt, die Gewebe brauner, brüchiger Muskulatur.	Sehr geringe sehr deutliche Farbe brauner.
90	810	Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Stauungsleber.	60	450	1.5	0.5	Beide Ventrikel umgegrössert und brüchiger verdickter Wand.	Auf der Seitenfläche ist das Gewebe verdichtet, die Zeichnung deutlich.
91	811	Überwundene tuberculo- se des linken O. L., Hyper- trophie und Dilatation des Herzens, Stauungsleber.	57	450	1.5	0.5	Beide Ventrikel umgegrössert um Krugform, brüchiger blasse, braune Muskulatur.	Auf dem Scheitel ist das Gewebe sehr brüchig, im ganzen von ganz gelber Farbe, die Zeichnung verwaschen.
92	812	Stauungsleber, endstadium des Aorta und Mitralis, beginnende Leber- tuberculose, Hypertrophie des Herzens.	55	450	1.5	0.5	Beide Ventrikel um stark verdickte Muskulatur, Aorten und Mitralis klappen am Rande verdickt.	Das Organ schneidet sich dabei als normal, die Farbe ist blassbraun, Die Zeichnung deutlich, Blutgefäß reichlich.

Lfde. Nummer	Nummer des Sektionsprot.	Anatomische Diagnose	Herz				Leber	
			Alter	Gewicht	Dicke des l. Ventrik.	Dicke des r. Ventrik.	Gewicht	
93.	527	Idiopathische Hypertrophie des Herzens; Sklerose der Coronargefäße.	57	590	1.8	0.4	1780	Derb, Schnittfl. glatt, acini mit dunklen Centren und helleren Randpartieen.
94.	531	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Stauungsleber.	53	630	1.1	0.6	2700	Die Oberfläche fühlt sich etwas granuliert an, das Organ selbst ist sehr derb.
95.	784	Hypertrophie des Herzens, chron. Tuberkulose des linken O.-L.; Stauungsleber.	54	420	1.5	0.3	1400	Die Consistenz ist deutlich vermehrt, auf der Schnittfläche ist die Zeichnung unregelmässig, von einzelnen gelben u. weisslichen Einlagerungen durchsetzt.
96.	798	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens. Stauungsorgane.	46	?	?	?	?	Sehr gross, dunkelbraunrot; Ober- und Schnittfläche glatt, Consistenz vermehrt.

97. 821	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens; Hypostase und hypostatische Pneumonie beider U.L.; Stauungsleber.	40	520	1.6	0.8	Beide Ventrikel je faustgross mit verdickter braunroter Muskulatur.	1930	Auf dem Schnitte ist die acinöse Zeichnung deutlich, die Consistenz ist leicht vermehrt.
98. 856	Hypertrophie und Dilatation des Herzens. Stauungsleber.	52	660	1.7	1.0	Beide Ventrikel beträchtlich erweitert mit verdickter, derber Muskulatur.	1980	Oberfläche im Allgemeinen glatt, auf der Kapsel einige narbige Einziehungen, d. Organ schneidet sich derb; Blutgehalt ist reichlich, Zeichnung wenig deutlich.
99. 1061	Idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens. Stauungsleber.	44	560	2.0	0.6	Beide Ventrikel ziemlich stark erweitert, mit enorm stark verdickter, blassbrauner Muskulatur.	2500	Das Organ schneidet sich ziemlich weich, die acinöse Zeichnung ist nicht erkennbar. Die Schnittfläche ist von braungelber Farbe, der Blutgehalt ziemlich mässig.

Fassen wir die einzelnen Fälle zusammen, so finden wir, dass bei den Frauen mit idiopathischer Herzhypertrophie die Leber in 66% schwerer war als 1500 gr. In den Fällen mit vergrößerter Leber finden wir nur 2 Fälle, wo die Vergrößerung durch die Diagnose »Fettleber« oder »Stauungsfettleber« erklärt werden könnte. Sonst lesen wir bei diesen Lebern als Diagnose im Sektionsprotokoll stets »Stauung« oder gar keinen pathologischen Befund. Speziell in diesen zuletzt erwähnten Fällen dürfen wir doch wohl eine Hypertrophie im wahren Sinne des Wortes annehmen.

Bei den Männern ergibt sich bei der idiopathischen Herzhypertrophie eine vergrößerte Leber in 73% der Fälle. Hierbei finden wir 36mal »Stauungsleber« als Diagnose des Leberbefundes, 5mal »Fettleber« und 8mal »hypertrophische Cirrhose«. In den anderen 17 Fällen ist eine andere Ursache oder Erklärung für die Grösse der Leber nicht zu finden. In den betreffenden Sektionsprotokollen findet man eine Beschreibung der jeweiligen Leber, welche dem Befund und Aussehen eines normalen Organes völlig gleichkommt oder wenigstens sehr ähnlich ist; der einzige abnorme pathologische Befund hierbei ist nur in der Vergrößerung der Leber gegeben.

Fragen wir uns nun, wie eine Hypertrophie der Leber bei der idiopathischen Herzhypertrophie zustande kommen kann, so könnte man zunächst daran denken, ob nicht auch die Ursachen, welche die idiopathische Herzhypertrophie erzeugen, ätiologisch für die Hypertrophie der Leber in Betracht kommen.

Als ursächliche Momente für die idiopathische Herzhypertrophie werden vor allem die körperliche Ueberanstrengung, Plethora und das Bierpotatorium angeführt. Wie diese Faktoren auf die Leber einwirken, ist noch nicht genügend festgestellt. Auch hält es sehr schwer dabei einen scharfen Unterschied zu machen, da für gewöhnlich beim Menschen wenigstens Ueberanstrengung und die durch das Bierpotatorium erzeugte plethora vera mit vereinten Kräften auf die Organe einwirken. Betrachten wir uns den Beruf der Leute, so finden wir in 65% der Fälle einen Beruf, der vermehrte Körperanstrengung erfordert. Es sind dies Schlosser, Schmiede,

Brauer, Ausgeher, Fuhrleute, Zimmerleute, Maurer, Maschinisten. Gleichzeitig müssen wir hier aber auch zugestehen, dass gerade bei den aufgezählten Berufsklassen erfahrungsgemäss die durch das Bierpotatorium gesteigerte Flüssigkeitsaufnahme sich geltend macht. Eine scharfe Grenze bei Leuten der erwähnten Berufsklassen, wie weit die körperliche Anstrengung, wie weit das Potatorium Veranlassung zu einer Vergrösserung der Leber sein könnte, zu machen, ist vorläufig meines Erachtens nach unmöglich. Betrachten wir einmal die Fälle mit Lebern über 2000 gr, so finden wir bei den erwähnten Berufsklassen die Grösse der Leber sehr selten durch die Diagnose »Fett« mit-erklärt, was aber häufiger der Fall ist bei Berufsklassen, wie Reisenden, Kellnern, Musikern, kurz Leuten, welche weniger körperliche Anstrengung zu leisten haben, als mehr durch das Potatorium sich einer Hypertrophie aussetzen. Bei Berücksichtigung dieser Tatsache würde sich vielleicht der Schluss erlauben, dass bei Schmieden, Schlossern u. s. w. eine bei idiopathischer Hypertrophie vorkommende hypertrophische Leber doch durch gesteigerte Muskeltätigkeit herbeigeführt werden könnte. Dass bei übermässiger Muskeltätigkeit tatsächlich eine Vergrösserung der Leber allein durch die vermehrte Anstrengung eintritt, wurde neuerdings durch Külb's festgestellt, der an Tieren, welche er arbeiten liess, gezeigt hat, dass bei der durch Arbeit erzeugten idiopathischen Herz-hypertrophie von den inneren Organen besonders die Leber an Grösse und Gewicht zunimmt. In seiner Arbeit »Experimentelles über Herzmuskel und Arbeit«, welche er im »Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie, Band 55 S. 288« veröffentlicht hat, beschreibt er zwei solche Fälle. Ueber die Anordnung des Versuches etc. kann in dem oben erwähnten Archiv Band 55 Seite 288 nachgelesen werden. Uns soll hier nur das Resultat des Versuches interessieren.

Tabelle I.

	Arbeitshund:	Kontrollhund:
Körpergewicht:	15200 g	15000
1. Skeiett	3120	3126+6
2. Muskulatur	5696+354	5342
3. Haut mit subcutanem Fett	2600	3150+555.

Organe:

	Arbeitshund:	Kontrollhund:
Herz	152+ 53	99
Leber	552+122	430
Nieren	88+ 10	78
Milz	44+ 5	39
Lungen	157+ 37	120
Pankreas	35+ 3	32

Tabelle II.

	Arbeitshund:	Kontrollhund:
Körpergewicht:	19200	20400 gr
1. Skelett	4345	4554+209
2. Muskulatur	6489	6776+287
3. Haut mit subcutanem Fett	3800	4700+700

Organe:

Herz	172+59	113
Leber	546+86	460
Nieren	93+17	76
Milz	25	37+12
Lungen	188+40	148
Pankreas	49+ 7	42

Külbs schreibt nun ferner: »Dass der Herzmuskel beim Arbeitstier an Gewicht zunehmen würde, hatte ich, wenn auch nicht in der Weise, erwartet. Interessanter scheint mir die Tatsache, dass zugleich die übrigen inneren Organe an Volumen und Gewicht zunahmen und unter diesen am meisten die Leber. Die Leber zeigt im 1. Falle eine Gewichts-differenz von 122 gr ($=28^0/0$), im 2. Falle eine solche von 86 gr ($=19^0/0$). Nach der Versuchsanordnung können Arbeit und Verdauung als an dieser Differenz sich unmittelbar beteiligende Faktoren ausgeschlossen werden. Die Frage, woher diese Differenz kommt, zu lösen, müssen nähere chemische Untersuchungen entscheiden. Nach Schnitt und Färbung kann ich einstweilen sagen, dass die histologische Struktur in beiden Fällen dieselbe ist. Fett und Eisen sind nicht nachweisbar.«

»Die Vergrößerung der Leber, welche anscheinend eine Vermehrung der organischen Elemente der Leber, der Leber-

zellen, bedeutet, erkläre ich mir vorläufig durch die Beziehungen der Leber zum inneren Stoffwechsel, speziell zum Kohlehydratstoffwechsel und Stoffwechsel in den Muskeln. Möglicherweise kommt auch die entgiftende Wirkung der Leberzellen in Betracht.«

Wie wir gesehen haben, ist Külbs der Ansicht, dass bei der Vergrößerung der Leber allenfalls der Stoffwechsel eine Rolle spielen könnte, was aber noch durch weitere eingehende Untersuchungen festgelegt werden müsste.

Vielleicht lässt sich aber doch auch die hypertrophische Leber beim Arbeitstier als eine Art regenerativer Hypertrophie erklären, was ich mir durch folgende Hypothese zurecht legen möchte:

Der arbeitende Muskel braucht zu seiner Ernährung Blut, viel Blut, das er sich durch Erweiterung seiner Gefäße verschafft. Wenn nun plötzlich in einem Gefäßgebiet des Körpers mehr Blut als sonst gebraucht wird, muss notwendigerweise ein anderes Blut hergeben, da die im Gefäßsystem vorhandene Blutmenge annähernd stets die gleiche bleibt, vorausgesetzt, dass sie nicht durch künstliche Aufnahme vermehrt wird. Wird nun gleichzeitig an mehreren Orten des Organismus mehr Blut als gewöhnlich gebraucht, so müssen dementsprechend andere Körperstellen mehr Blut abgeben. Diese Art der Regulierung des Kreislaufes jedoch hat gewisse Grenzen, da bekanntlich der Blutgehalt mancher Gewebe nicht unter ein gewisses Mass sinken darf, wenn das Leben der Zellen erhalten bleiben soll. Wird nun bei starker körperlicher Anstrengung in den Muskeln viel Blut gebraucht, so wird auch die Leber Blut abgeben müssen, was bei längerer und wiederholter Dauer sicherlich schädigend für die Leberzellen ist, womöglich Gruppen von Leberzellen zum Absterben bringt. Im Anschluss daran könnte es jetzt auch hier zu einer regenerativen Hypertrophie kommen, wie wir dies eingangs bei der akuten gelben Leberatrophie, der Cirrhose etc. gesehen haben.

Wie sich der Prozess bei der plethora vera erklären lässt und verhält, ist meiner Ansicht insofern nicht ganz leicht festzustellen, als hiebei auch die schädigende Wirkung des

Alkohols mit in Betracht gezogen werden muss. Ferner habe ich schon weiter oben erwähnt, dass das Bierpotatorium häufig bei Leuten beobachtet wird, die gleichzeitig schwer körperlich arbeiten müssen.

Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass Professor v. Bollinger die Ansicht vertritt, dass die bei idiopathischer Herzhypertrophie so häufig vorkommende Lebervergrösserung, die in der Hauptsache eine wahre Hypertrophie darstellt, wenigstens teilweise erklärt werden könnte aus der Wirkung des überreichlichen Biergenusses, wobei die fortdauernde Zufuhr des verdünnten Alkohols einerseits eine leichte Reizung und Zunahme des Leberstützgewebes, andererseits eine nutritiv gesteigerte Wirkung auf die Leberzellen auszuüben imstande sei, während der habituelle Genuss konzentrierten Alkohols (Branntwein, starke Weine) eine produktive des Leberstützgewebes mit partieller Zerstörung und Atrophie des Parenchyms erzeugt. Die chronische Stauungshyperämie ist nur in einzelnen Fällen als mitbetheiligter Faktor in Rechnung zu ziehen.

Die von Külbs experimentell bei Hunden erzeugte Leberhypertrophie bei gleichzeitiger funktioneller Arbeitshypertrophie des Herzens beruhe wohl auf einer Veränderung des Stoffwechsels und der Zirkulation, deren Erklärung vorläufig unmöglich ist.

Es bleibt mir nur mehr die angenehme Pflicht übrig, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Obermedizinalrat Professor Dr. Otto v. Bollinger meinen ergebensten Dank für die Anregung und Ueberlassung obigen Temas, sowie für die lebenswürdige Unterstützung, welche er mir bei Anfertigung der Arbeit angedeihen liess, auszusprechen. Gleichzeitig sei es mir auch gestattet, Herrn Obermedizinalrat v. Bollinger für die Uebernahme des Referates bestens zu danken.

Literatur-Verzeichnis.

- von Bollinger, Atlas und Grundriss der patholog. Anatomie.
Kaufmann, Lehrbuch der pathologischen Anatomie.
Schmaus, Grundriss der pathologischen Anatomie.
Külbs, Archiv für experimentelle Pathologie und
Pharmakologie, Band 55.
Rössle, Dr. med., Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morpho-
logie und Physiologie in München. 1908.

Unterzeichneter ist geboren am 9. Mai 1882 zu Lindau im Bodensee als der Sohn des praktischen Arztes Adolf Kimmerle. Er besuchte dort die Volksschule 4 Jahre lang, darauf eben dort die 5klassige kgl. Lateinschule. Vom 18. Sept. 1897 bis 15. Juli 1901 besuchte er das kgl. Luitpoldgymnasium zu München, das er im Juli mit dem Zeugnis der Reife verliess. Im Winter-Semester 1901/02 gehörte er der kgl. bayr. technischen Hochschule an, vom Sommer-Semester 1902 ab der kgl. bayr. Universität zu München, woselbst er zunächst 1 Semester Chemie, von da ab Medizin studierte.

Am 28. Februar 1905 bestand er die ärztliche Vorprüfung, am 7. Mai 1907 beendete er gleichfalls in München das medizinische Staatsexamen. Vom 1. Juni 1907 bis zum 1. Oktober 1907 befand sich Unterzeichneter als Medizinalpraktikant am kgl. bayr. pathologischen Institut zu München. Am 1. Oktober 1907 trat er als Einj.-Freiw. beim kgl. bayr. 9. Feld-Art.-Rgt. ein, um hier das 1. Halbjahr zu dienen.

Landsberg am Lech, den 22. Januar 1908.

Adolf Kimmerle.

